

Name: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

## Sandohrwurm

*Labidura riparia*

13 - 26 mm



© Wachmann

**Ordnung:** Dermaptera - Ohrwürmer

**Familie:** Labiduridae

**Kennzeichen:**

- Körper strohgelb mit dunkelbrauner Zeichnung
- am Körperende sehr lange, zangenartige, fast gerade Anhänge (im Gegensatz zum *Gemeinen Ohrwurm*, der zueinander gebogene Zangen besitzt)
- Vorderflügel kurz und deckenartig, bedecken nicht den Hinterleib
- Hinterflügel unter den kurzen Deckflügeln mehrfach gefaltet, flugfähig

**Entwicklung:**

- Weibchen legen im Frühjahr und im Herbst Eier in sandigen Böden ab
- sie beschützen die Eier, bis die Larven ausschlüpfen (Brutfürsorge)
- Larven häuten sich 4 - 5 Mal

**Lebensweise:**

- Hinterleibszangen dienen der Verteidigung und werden in Drohhaltung dem Feind entgegengestreckt
- leben in Erdröhren, die sie von Innen verschließen; hier auch Überwinterung
- Allesfresser mit überwiegend tierischer Nahrung

**Vorkommen:**

- im Gegensatz zum häufig vorkommenden *Gemeinen Ohrwurm* kommt diese Art relativ selten auf sandigen Böden, an sandigen Flussufern oder Küsten vor